



دانشگاه علوم پزشکی

خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

حوزه معاونت درمان

بس تعالی

تاریخ:

۱۳۹۲/۰۳/۲۲

شماره:

پیوست:

۱۶/۳۳/۱۸۵۱

دارد

جناب آقای دکتر رضایی

ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت

جناب آقای دکتر منافی

ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق اکباتان

جناب آقای دکتر عینی

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی فرشچیان

سرکار خانم دکتر رادنیا

سرپرست محترم مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی فاطمیه

جناب آقای دکتر معصومی

ریاست محترم مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی

ریاست محترم بیمارستان آیت الله بهاری


ریاست محترم بیمارستان

موضوع: ارسال دستورالعمل مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد- کورونا

ویروس جدید- اردیبهشت ۹۲

با سلام و احترام

بدینوسیله پیوست به نامه شماره ۴۲۶۸۷/۳۰/۱۸ مورخ ۹۲/۳/۱۸ دستورالعمل مدیریت بالینی مناسب
موارد عفونت تنفسی شدید حاد- کورونا ویروس جدید- اردیبهشت ۹۲ جهت استحضار و بهره برداری به
حضور ایفاد می گردد. اس




آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت‌الله... کاشانی - ساختمان شماره ۲ حوزه معاونت درمان

تلفن: ۰۱۵-۰۳۲-۰۳۷۰۲۵۶-۰۲۵-۰۳۵۵۲۳۰۱۱

(۱)

شماره: ۵۳۰۴/۲۶۸۷
 تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
 پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، دان و آموزش پزشکی



معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ارسال دستورالعمل مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد - کورونا ویروس جدید-

اردیبهشت ۱۳۹۲

سلام علیکم

احتراماً به پیوست دستورالعمل مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد درمواردی که احتمال کورونا ویروس بعنوان عامل بیماری مطرح می باشد (اردیبهشت ۱۳۹۲) بر اساس اخرین توصیه های سازمان جهانی بهداشت جهت استحضار و بهره برداری و انعکاس به کلیه بخش های درمانی تحت پوشش آن دانشگاه ارسال می گردد.

دکتر محمد مهدی گویا

مشاور معاون بهداشت
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واکنش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 امانت گرو و آیینه های بیوپرائیتی های تغذیه
 شماره ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تاریخ
 واحد اندام گشته

بررسی محض روزانه

دکتر محمد مهدی گویا
 مشاور معاون بهداشت
 رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واکنش
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 امانت گرو و آیینه های بیوپرائیتی های تغذیه
 شماره ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تاریخ
 واحد اندام گشته

۱) آغاز رکور جداول

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد
هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد
(باید ها و نباید ها)

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

اداره مراقبت واگیر

اردیبهشت ۱۳۹۲

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

بخش اول: تشخیص و درمان سریع:

تظاهرات شدید عفونت های تنفسی حاد را تشخیص دهید

جدول ۱: تعریف نشانگان بالینی	
فردی با عفونت تنفسی حاد که سابقه تب (درجه حرارت بالای ۳۸ درجه دهانی)، و بیماری بافت ریه (پنومونی، ARDS) بر اساس شواهد رادیولوژیک یا بالینی، و سابقه اقامت یا سفر به عربستان و کشورهای همسایه در ۱۰ روز گذشته داشته و این وضعیت بالینی وی با هیچ عامل عفونت زای دیگری (که بر اساس دستواعمل کشوری بررسی میشود) قابل توجیه نباشد.	بیمارانی که برای کوروناویروس جدید بررسی می شوند "Patient under investigation"
برای بررسی کوروناویروس نیاز نیست منتظر جواب آزمایش برای سایر میکروارگانیسم ها باشید.	پنومونی شدید
بیمار بالغ که تبدار یا مشکوک به عفونت بوده، و سرفه، تنفس تندر (بیش از ۳۰ بار در دقیقه)، تنفس دشوار شدید، غلظت اکسیژن خون در هوای اتاق کمتر از ۹۵٪ دارد	نشانگان تنفس دشوار حاد (ARDS)= سندرم دیسترنس تنفسی حاد
شروع: حاد، به عنوان مثال در طی ۱ هفته از شروع بیماری علائم تنفسی تشدید شده یا آغاز گردد تصویر برداری قفسه صدری (CT-scan یا X-ray): کدورت دوطرفه ، که با افیوژن یا کلابس ریه یا ندول ریه قابل توصیف نیست منشا ادم ریه: نارسايی تنفسی که با نارسايی قلب یا مایع زیاد قابل توجیه نیست.	ناشانگان تنفس دشوار حاد (ARDS)= سندرم دیسترنس تنفسی حاد
میزان هیپوکسمی: در حالیکه CPAP یا PEEP بیش از ۵ سانتی متر آب است اگر $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر جیوه باشد ARDS <u>خفیف</u> ، و اگر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر جیوه باشد ARDS <u>متوسط</u> گفته می شود، و اگر کمتر از ۱۰۰ میلیمتر جیوه پسند ARDS <u>شدید</u> نامیده می شود. اگر PaO_2 معلوم نباشد می توان از $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ استفاده نمود که اگر کمتر از ۳۱۵ باشد مطرح کننده ARDS است.	

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نبایدها)

<p>وجود عفونت قطعی یا مشکوک، به همراه دو یا بیشتر از این علائم: درجه حرارت بدن کمتر از ۳۶ یا بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد، ضربان قلب بیش از ۹۰ بار در دقیقه، تعداد تنفس بیش از ۲۰ بار در دقیقه یا PaCO_2 کمتر از ۳۲ میلیمتر جیوه، شمارش گلبول های سفید بیش از ۱۲۰۰۰ یا کمتر از ۴۰۰۰، یا بیش از ۱۰ درصد گلبول های سفید از نوع نابالغ (Band) باشند</p>	<p>سپسیس</p>
<p>وقتی سپسیس به همراه اختلال عملکرد اعضاء، هایپویرفیوزن (لاکتیک اسیدوزیس) یا افت فشار خون باشد.</p> <p>اختلال عملکرد اعضاء شامل: آسیب حاد کلیه، الیگوری، هیپوکسمی، افزایش ترانس آمینازها، اختلال انعقادی، پلاکت پائین، تغییر وضعیت ذهنی، ایلئوس، افزایش بیلیروبین</p>	<p>سپسیس شدید</p>
<p>علائم هایپو پرفیوزن و افت فشار خون ناشی سپسیس (فشار خون سیستولیک کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه) علی رغم مایع درمانی کافی</p>	<p>شوک سپتیک</p>

اقدامات پیشگیرانه و کنترلی آغاز شود:

اقدامات احتیاطی تنفسی ریزقطرات (droplet precaution) را می توان به اقدامات احتیاطات استاندارد در مورد هر بیمار که علائم عفونت تنفسی حاد دارد از جمله عفونت تنفسی با کوروناویروس جدید اضافه نمود. این اقدامات احتیاطی را باید از همان بدو ورود بیمار دارای بیماری تنفسی تبدیل حاد به بخش تریاژ اورژانس آغاز نمود. بین بیمارانی که با علائم تنفسی حاد مراجعه نموده اند و سایر افرادی که از وسائل حفاظت فردی استفاده نمی کنند فاصله مناسب (حداقل یک متر) رعایت شود. فضای اتاق تریاژ و اتاق انتظار باید به خوبی تهویه شوند. توصیه می شود بهداشت تنفسی (بوشاندن دهان و بینی تا هنگام سرفه و عطسه نمودن با ماسک طبی، ماسک پارچه ای، دستمال، آستین یا آرنج خم شده) رعایت شده و بهداشت دست ها (شستشوی صحیح) بعد از آن انجام گردد.

اقدامات کنترل عفونت	
اقدامات احتیاطی استاندارد	بطور معمول برای تمام بیماران اجرا می شود. این اقدامات شامل بهداشت دست ها و استفاده از وسائل محافظت شخصی (PPE) برای دوری از تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات بدن بیمار (شامل ترشحات تنفسی) و پوست آسیب دیده است. وقتی اقدامات درمانی برای یک بیمار با علائم تنفسی (سرقه یا عطسه یا ...) در تماس نزدیک انجام می شود چشم های خود را در برابر پاشیدن ترشحات با استفاده از محافظت چشم بپوشانید. احتیاطات استاندارد شامل: پیشگیری از آسیب تیز یا ورود سوزن آلوده، دفع بی خطر زباله ها، تمیز نمودن و ضد عفونی کردن وسائل، تمیز کردن محیط
اقدامات احتیاطی ریز قطرات (droplet)	اگر در فاصله کمتر از 1 متر از بیمار به درمان او پرداخته می شود از ماسک باید استفاده کرد. بیمار را در اتاق انفرادی قرار دهید و یا کسانی که عامل اتیولوژیک یکسانی دارند در یک اتاق بصورت گروهی قرار دهید. اگر عامل اتیولوژیک قابل شناسایی نباشد بیمارانی که تشخیص کلینیکی یکسانی دارند و براساس ریسک فاکتورهای اپیدمیولوژیک در فاصله یک متر از هم می توان بستری نمود. جابجایی بیماران را باید محدود نمود و در صورتی که از اتاق خارج می شوند باید از ماسک طبی استفاده نمایند.
اقدامات احتیاطی هوابرد (airborne)	افراد تیم بهداشت درمان اگر اقداماتی که تولید آئروソول میکند انجام می دهند باید از وسائل محافظت (PPE) مناسب استفاده نمایند: دستکش، روپوش بلند، محافظ چشم و ماسک مناسب N90 و یا معادل آن. هر وقت امکان دارد در موقع انجام اقداماتی که تولید آئروソول می کنند بهتر است در اتاق ایزوله انفرادی با تهویه کافی انجام شود.

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

برای تمام بیماران مبتلا به عفونت تنفسی شدید حاد اکسیژن درمانی کافی انجام شود:

بیمارانی که دشواری تنفسی دارند، هیپوکسمی دارند ($\text{SpO}_2 < 90\%$), یا دچار شوک هستند تحت اکسیژن درمانی قرار گیرند. اکسیژن درمانی با میزان ۵ لیتر در دقیقه آغاز شود و تا رسیدن به SpO_2 بالاتر یا مساوی ۹۰٪ در بالغین غیر باردار یا بالاتر از ۹۲٪ در افراد باردار ادامه باید. در تمام مراکزی که از بیماران تنفسی شدید مراقبت می نمایند باید دستگاه مناسب اکسیژن درمانی و پالس اکسی متري وجود داشته باشد.

نمونه مناسب از ترشحات تنفسی تهیه گردد:

- در پنومونی های اکتسابی از جامعه، ترجیحاً قبل از استفاده از آنتی بیوتیک، نمونه های بالینی معمول تهیه گردد (کشت باکتریال خلط و خون).
- همچنین از راه هوایی فوکانی (سواب حلقی، حلقی سینی و بینی) و از راه هوایی تحتانی (خلط، آسپیره نای، لاواز برونکوالوئولار) برای بررسی ویروس ها (آنفلوانزا A و B ، آنفلوانزا A زیر گونه H1N1, H3N2, H2N3) در کشورهایی که H1N1 در پرنده گردش است، RSV، پارآنفلوانزا، رینوویروس، آدنوویروس، متاپنوموویروس و کوروناویروس های غیر از سارس) نمونه تهیه شود.
- اگر نمونه های متعدد در روزهای مختلف (هر ۲ تا ۳ روز) و از قسمت های مختلف تنفسی تهیه گردد در مورد انتشار ویروس از راه تنفسی اطلاعاتی بدست خواهد آمد.
 - با بررسی خون، ویرمی مشخص می شود.
 - در صورت کونزکتیویت از ملتحمه نمونه تهیه گردد.
- نمونه ادرار، مدفوع و مایع مغزی نخاعی (اگر مایع مغزی نخاعی تهیه شده است) نیز بررسی گردد.
- بررسی آزمایشگاهی با RT-PCR انجام می گردد.

درمان تجربی آنتی بیوتیکی مناسب برای میکرووارگانیسم های احتمالی (از جمله میکروب های شایع

در پنومونی اکتسابی در جامعه) آغاز گردد:

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

- هرچند بیمار محتمل کوروناویروس باشد، اما باید درمان وسیع الطیف برای شایعترین میکروب های عامل بیماری بر اساس اپیدمیولوژی، تا زمان تایید نهایی تشخیص آزمایشگاهی، تجویز گردد.
- مایع درمانی در بیماران عفونت تنفسی حاد شدید اگر علائمی از شوک وجود ندارد بصورت نگهدارنده (conservative) شروع گردد.
- مایع درمانی وریدی در بیماران دچار عفونت تنفسی حاد شدید باید با احتیاط انجام گیرد، چراکه مایع درمانی شدید (مخصوصا اگر امکانات لازم برای تهییه مکانیکی بیمار موجود نباشد) بر میزان اکسیژن بیمار تاثیر منفی دارد.
- به غیر از موارد تحقیقاتی از دوز بالای کوتیکوستروئید سیستمیک یا سایر روشهای کمکی در پنومونی ویروسی خودداری نمائید.
- در بیماران مبتلا به عفونت تنفسی حاد شدید اگر طولانی مدت درمان با کوتیکوستروئید با دوز بالا انجام شود، عوارض جدی، از جمله نکروز آواسکولار، عفونت های اضافه شونده فرصت طلب، عفونت های بیمارستانی باکتریال و نکثیر طولانی تر ویروس را بدنبال خواهد داشت. درنتیجه از تجویز کوتیکوستروئید ها (مگر به دلیل دیگری لازم باشد) باید خودداری شود.
- بیماران عفونت تنفسی حاد شدید را از نظر تشدید وضعیت بالینی و بروز نارسایی تنفسی، سختی تنفسی شدید، هایپوپرفیوژن بافتی و شوک تحت نظر بگیرید و اقدامات درمانی حمایتی انجام گردد.

بخش دوم: برخورد بالینی با مشکل تنفسی شدید، هایپوکسمی و ARDS

- موارد شدید را که مشکل تنفس آنها علی رغم تجویز اکسیژن درمانی با دوز بالا بهبود نمی‌باید شناسایی نمایید.
- وقتی دوز بالای اکسیژن درمانی (۱۰ تا ۱۵ لیتر در دقیقه) توسط ماسک دارای *reservoir bag* انجام می‌شود و FiO_2 هنوز بالا (بین ۰.۶ الی ۰.۹) باشد، بدليل وجود شانت داخل ریوی بیماران کماکان کار زیاد تنفسی را تحمل نموده و هایپوکسمی خواهند داشت و نیاز به تهophage مکانیکی پیدا خواهند نمود. امروزه سیستم‌های پیشرفته‌ای وجود دارند که می‌توانند با استفاده از کانولای بینی میزان بالایی تا حد ۵۰ تا ۶۰ لیتر در دقیقه اکسیژن برای بیمار تامین نمایند. هرچند در برخی مطالعات بهبود علائم تنفسی بیماران دچار سختی تنفسی و اصلاح سطح اکسیژن آنها دیده شده است، اما اینگونه سیستم‌ها را در همه مراکز نمی‌توان یافت.
- اگر علی رغم اکسیژن درمانی با دوز بالا هایپوکسمی و افزایش کار تنفسی بیماران ادامه باید، توصیه می‌شود در صورت وجود نیروی آموزش دیده و وجود شرایط مناسب از دستگاه تنفس مصنوعی مکانیکی استفاده شود
- در شرایطی که نیاز به تهophage مکانیکی باشد بر اساس نیروی آموزش دیده و امکانات تصمیم گرفته می‌شود که از روش‌های تهophage مکانیکی غیر تهاجمی با ماسک (NIV) و یا تهاجمی (از طریق لوله گذاری داخل نای و یا *tracheostoma*) استفاده شود.
- در موارد نشانگان سختی تنفسی حاد خفیف در افراد مبتلا به نقص ایمنی اگر نارسایی قلبی تنفسی و اختلال هوشیاری وجود ندارد، (در صورت وجود نیروی درمانی مجروب) از NIV استفاده شود
- روش NIV فراهم‌سودن اکسیژن با فشار ثابت توسط ماسک است. در بیماران دارای تشید بیماری ریوی انسدادی مزمن (COPD) و ادم ریوی (با منشا قلبی) استفاده از NIV نیاز به لوله گذاری داخل نای را کمتر کرده است. اگر از NIV استفاده می‌شود باید بیمار را در ICU تحت پایش دقیق قرار داد.

مدیریت بالینی مناسب با موارد عفونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

- ذر صورت وجود نیروی آموزش دیده و شرایط لازم از لوله گذاری نای در بیماران ARDS استفاده نماید
- بیماران مبتلا به ARDS مخصوصا اگر چاق باشند و یا خانم های باردار، بعد از لوله گذاری نای خیلی زود دچار افت غلظت اکسیژن خون می شوند. به همین دلیل باید این بیماران را با $\text{FiO}_2 \geq 100\%$ به مدت ۵ دقیقه با ماسک دریچه دار (bag-valve mask) یا NIV اکسیژن نمود.
- از استراتژی تهویه محافظت کننده از ریه (LPV) در درمان بیماران مبتلا به ARDS استفاده نماید
- از استراتژی حجم کم- فشار کم که $\text{ml/kg} \leq \text{tidal volume}$ هدف PaCO_2 بین ۸۰ تا ۹۳٪ یا SpO_2 بین ۸۸ تا ۹۳٪ است
- استفاده نماید. این روش با مرگ و میر کمتری در بیماران ARDS همراه بوده است.
- برای رسیدن به اهداف LPV بیمار در حد مجاز هایپرکاپنی می شود.
- برای رسیدن به $\text{SpO}_2 \geq 95\%$ هدف بر اساس درجه های پوکسمی از PEEP کافی استفاده نماید.
- در موارد تحریک دوگانه (double-triggering) که نوعی asynchrony است می توان با افزایش زمان دم و افزایش جریان دم، انجام ساکشن نای و حذف آب از لوله های دستگاه ventilator بر این مشکل غلبه نمود.
- اگر کنترل tidal volume حاصل نشود می توان از آرامبخشی عمیق (deep sedation) استفاده نمود.
- از جدا نمودن بیمار از دستگاه تنفس مکانیکی خودداری نماید. جدا نمودن بیمار از دستگاه منجر به از دست رفتن PEEP و کلپس ریه می گردد. در این گونه موارد از لوله های ساکشن in-line استفاده شود و بعد از اتمام ساکشن، لوله را ببندید (clamp).
- در بیماران دچار ARDS شدید استفاده زودتر از روشهای کمکی را مدنظر داشته باشید، مخصوصا اگر به اهداف LPV دست نیافته اید
- استفاده از بلوك کننده های نوروترانسمیتر ها در ۴۸ ساعت اول با بهبود بیشتر همراه بوده اند.
- قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده (prone) میزان اکسیژن خون بیمار و میزان بهبودی نهایی را بهبود می بخشد. البته باید در چرخش متناوب بیمار احتیاط لازم را انجام داد.
- استفاده از PEEP بالا و مانور recruitment به بهبود وضعیت تنفسی بیمار کمک می کند.
- برای کوتاه نمودن دوره تهویه مکانیکی در بیماران ARDS که در شوک نیستند، از مایع درمانی محافظه کارانه استفاده نماید.

بخش سوم: برخورد با شوک سپتیک

- وقتی بیماران سپتیک علی رغم مایع درمانی اولیه دچار افت فشار ($SBP < 90 \text{ mmHg}$) می‌شوند یا علائم های پرفیوژن در آنها دیده می‌شود (غلظت لاکتان خون بالای 4 mmol/L)، وضعیت شوک ناشی از سپسیس بوجود آمده است و بر اساس پروتکل بیمار را احیا نمائید.
- در وب سایت Surviving Sepsis Campaign پروتکل احیا بیماران وجود دارد. بر اساس تجربه نیروهای درمانی و امکانات موجود می‌توان از کاتتر شریانی و یا کاتتر وریدی مرکزی استفاده نمود. از تجویز زودهنگام و سریع مایعات کریستالوئید وریدی در بیماران مبتلا به شوک سپتیک استفاده نمائید.
- مایعات کریستالوئید (نرمال سالین، رینگر لاکتان) برای تجویز حجم ابتدایی (loading/Bolus) به صورت یک لیتر در عرض ۳۰ دقیقه یا سریعتر مناسب هستند. سپس بر اساس میزان پاسخ در پرفیوژن بافتی می‌توان تصمیم گرفت که آیا مایع bolus بیشتری نیاز هست یا خیر.
- مایع درمانی زیاده از حد می‌تواند باعث اختلال در تنفس بیمار گردد. اگر پاسخ مناسب به مایع درمانی اولیه دیده نشود اما علائم و نشانه‌های زیاده از حد بودن (overload) مایع پدیدار گردد، مانند شنیدن رال در سمع ریه‌ها و یا دیدن شواهد ادم ریه در گرافی قفسه صدری، باید مایع درمانی را کاهش داده یا متوقف نمود. این امر مخصوصاً در شرایطی که دستگاه تنفس مکانیکی وجود ندارد اهمیت دارد.
- از محلول‌های هایپوتونیک و starch based برای مایع درمانی این بیماران استفاده نشود. محلول‌های starch based با اختلال کارکرد کلیه و یا نارسایی کلیه همراه هستند. اگر علی رغم مایع درمانی افت فشار بیمار جبران نشود از واژوپرسورها استفاده شود.
- واژوپرسورها (نوراپینفرین، اپینفرین و دوبامین) از راه کاتتر وریدی مرکزی بدون ایجاد خطر و با سرعت قابل کنترل قابل تجویز هستند. فشار خون بطور متواتر قابل اندازه گیری است و می‌توان حداقل مورد

مدیریت بالینی مناسب با موارد عقونت تنفسی شدید حاد هنگامی که احتمال می رود که کوروناویروس عامل بیماری باشد (باید ها و نباید ها)

نیاز را تا بدست آمدن نتیجه مطلوب (فشار خون سیستولیک بالای ۹۰ میلیمتر جیوه) تجویز نمود تا از عوارض جانبی آنها جلوگیری شود.

- در برخی شرایط که امکان تهیه ورید مرکزی وجود ندارد می توان واژوپرسورها را از راه یک ورید محیطی بزرگ تجویز نمود، اما باید به دفعات و به دقت آنرا مورد بازرسی قرار داد تا از نشانه های extravasation و نکروز به سرعت مطلع شویم. در صورت بروز این عارضه باید سریعاً تجویز واژوپرسور را قطع نمود.
- از تجویز هیدروکورتیزون وریدی (تا ۲۰۰ میلیگرم روزانه) یا پردنیزولون (تا ۷۵ میلیگرم روزانه) در بیماران مبتلا به شوک مقاوم که نیاز به کاهش میزان واژوپرسور دارند می توان استفاده نمود.